

**Basisinformation für Fachkreise**

---

**Fortacin® 150 mg/ml + 50 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung**  
Lidocain/Prilocain

**Zusammensetzung:** Jeder ml der Lösung enthält 150 mg Lidocain und 50 mg Prilocain. Jeder Sprühstoß liefert 50 Mikroliter, die 7,5 mg Lidocain und 2,5 mg Prilocain enthalten. 1 Dosis entspricht 3 Sprühstößen. Sonstiger Bestandteil: Norfluran. **Anwendungsgebiet:** Fortacin wird zur Behandlung von vorzeitiger Ejakulation, die bei erwachsenen Männern (ab 18 Jahren) ab dem ersten Geschlechtsverkehr auftritt, angewendet. D. h., dass diese immer oder fast immer innerhalb von einer Minute ab dem Beginn des Geschlechtsverkehrs einen Samenerguss haben und dies negative emotionale Auswirkungen hat. Fortacin wirkt, indem es die Sensibilität der Eichel des Penis verringert, um die Zeit vor der Ejakulation zu verlängern. **Gegenanzeigen:** Allergie eines Sexualpartners gegen Lidocain, Prilocain oder Norfluran. Allergische Reaktion eines Sexualpartners oder Überempfindlichkeit auf andere lokale Betäubungsmittel mit einer ähnlichen Struktur (bekannt als lokale Betäubungsmittel vom Amidtyp) in der Vergangenheit. **Folgende Nebenwirkungen wurden bei männlichen Patienten berichtet:** *Häufig:* Unfähigkeit, eine Erektion zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; verminderte Sensibilität am und um den Penis; Brennen am und um den Penis. *Gelegentlich:* Kopfschmerzen; lokale Reizung des Rachens (wenn eingeatmet); Hautreizung; Rötung am und um den Penis; ausbleibende Ejakulation während des Geschlechtsverkehrs; anomaler Orgasmus; Kribbeln am und um den Penis; Schmerzen oder Beschwerden am und um den Penis; Jucken am und um den Penis; erhöhte Temperatur. **Folgende Nebenwirkungen wurden bei Sexualpartnern berichtet:** *Häufig:* Brennen in der und um die Scheide; verminderte Sensibilität in der und um die Scheide. *Gelegentlich:* Kopfschmerzen; lokale Reizung des Rachens (wenn eingeatmet); Pilzinfektion der Scheide (Candida); Beschwerden an Anus und Enddarm; Taubheitsgefühl im Mund; Schwierigkeiten oder Schmerzen beim Wasserlassen; Schmerzen in der Scheide; Beschwerden oder Juckreiz an der Vulva und in der Scheide. **Apothekenpflichtig. Stand:** September 2023. **Pharmazeut. Unternehmer:** Recordati Ireland Limited., Raheens East, Ringaskiddy Co. Cork P43 KD30 (Irland). **Repräsentant in Deutschland:** Recordati Pharma GmbH, 89075 Ulm (Deutschland).

---

Versionscode: F\_B06