

## Basisinformation außerhalb der Fachkreise

---

### **Fortacin® 150 mg/ml + 50 mg/ml Spray zur Anwendung auf der Haut, Lösung**

**Wirkstoffe:** Lidocain und Prilocain. **Anwendungsgebiet:** Fortacin wird zur Behandlung von vorzeitiger Ejakulation, die bei erwachsenen Männern (ab 18 Jahren) ab dem ersten Geschlechtsverkehr auftritt, angewendet. D. h., dass diese immer oder fast immer innerhalb von einer Minute ab dem Beginn des Geschlechtsverkehrs einen Samenerguss haben und dies negative emotionale Auswirkungen hat. Fortacin wirkt, indem es die Sensibilität der Eichel des Penis verringert, um die Zeit vor der Ejakulation zu verlängern. **Apothekenpflichtig. Stand:** September 2023. **Pharmazeut. Unternehmer:** Recordati Ireland Limited., Raheens East, Ringaskiddy Co. Cork P43 KD30 (Irland). **Repräsentant in Deutschland:** Recordati Pharma GmbH, 89075 Ulm (Deutschland).

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

---

Versionscode: F\_B03